

Дата внедрения и дополнительные раунды
2009, 2011

Площадь размещения на упаковке

Предупредительные надписи должны покрывать 50% лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных изделий. В целом, предупреждения о вреде курения должны занимать 50% общей площади упаковки.

График ротации и хронология

На упаковках табачных изделий используются два

вида предупредительных надписей. В Иране разработаны два набора предупредительных надписей. Первый вступил в действие в 2009 году, второй набор из двух видов предупредительных надписей – в 2011 году..

Ограничения в отношении информации, вводящей в заблуждение

Установлен запрет на использование на упаковках таких вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и «мягкие»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2011



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2009



مصرف سیگار از عوامل عمده بروز سرطان دهان و لب می باشد. این نوع سرطان مشکلاتی در جویدن و بلعیدن ایجاد می نماید

استعمال دخانیات سبب بروز آسیب های جدی به مخاط دهان و زبان و در نهایت سرطان زبان می شود

مواجهه با دود سیگار، قلبان و مواد دخانی مصرف شده توسط والدین و اطرافیان باعث ایجاد و تشدید بیماریهای تنفسی، آسم و عفونت گوش میانی می شود



استعمال دخانیات سبب آسیب های جبران ناپذیری به بافت چشم، اعصاب مرکزی بنایی و در نهایت کوری می شود.

افراد سیگاری ۳ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر ابتلا به انواع سرطانهای پوست هستند